

NÅGRA RADER FRÅN OSS I HEDEMORA-CIRKELN

Håkan Persson

Vi har varit 10 stycken och träffats 10 gånger. Den första träffen hade vi den 15 Maj i Norrhyttedalen norr om Vikmanshyttan, där vi utan framgång letade efter skuggviol, *Viola selkirkii*. Elis Dahlgren, kunnig amatörbotanist och född nära Norrhyttedalen, var med på denna första träff och kunde vittna om de stora förändringar som skett i dalarna. Främst på grund av igenväxning genom upphörande med bete och slätter. På många platser vi besökt kan väl just igenväxningen sägas vara boven. Andra orsaker till försvunna växtlokaler kan, som i centrala Hedemora, vara att det byggts på platsen.

Som ni förstår av föregående rader, har bytet varit skräligt för oss i cirkeln. Det enda fyndet är, för att tala ubåtsspråk, en möjlig men ännu ej bekräftad svedjenäva, *Geranium bohemicum*, som intill sjön Gåran i Vikmanshyttan växte i tre exemplar.

Vi har också varit och tittat på klockkljung, *Erica tetralix*, i Norn samt stortimjan, *Thymus pulegioides*, i Vikmanshyttan.

Några fina återfynd har gjorts privat av medlemmar i studiecirkeln, såsom 2 återfynd av oxtunga, *Anchusa officinalis*, i Hedemora; majviva, *Primula farinosa*, nära sopstationen i Hedemora; nässelsnärja, *Cuscuta europaea*, i Vikbyn och Garpenberg, samt det mest glädjande fyndet av alla: krissla, *Inula salicina*, på Ratholmen i sjön Amungen i Husby socken. Den sågs första gången 1861 på Ratholmen, där den har sin enda växtplats i Dalarna, och är idag fortfarande mycket livskraftig och finns i stort antal.

Vi har i år koncentrerat oss på Hedemora socken och tänkte under 1989 beta av Husby och Garpenbergs socknar.