

Grönvit nattviol- en nyfunnen spillra

Sommaren 1986 blommade på en gammal slätteräng i landskapets sydligare del ett femtiotal exemplar av grönvit nattviol, (*Platanthera chloranta*).

Ängen tillhör höjdbebyggelsen - den är alltså av "finntorpstyp" - i Södra Bisen, inom Malingsbo-Klotens naturvårdsområde och är en av de få i trakten som fortfarande slåttras ogödslad.

Under torpets aktiva brukningsperiod var säkert lokalen tidvis upplöjd och följaktligen en slättervall. Jorden har nu inte odlats på mycket länge och vegetationen har blivit alltmer ängsartad.

Nattviolerna växte i ett medelfriskt parti av ängen, tillsammans med bl a daggekåpa, svartkämpar, jungfrulin, smällglim, rödven, ängsgröe, hundäxing, ängskavle, blekstarr, hirsstarr, ängsskallra, kärrfibbla samt mindre ruggar av brudborste och svinrot.

Området är överhuvudtaget mycket rikt, med flera arter indikerande en välneutraliserad jordmån och kanhända är karbonatbergarter i det genomlöpande leptitstråket av betydelse i sammanhanget.

Förekomsten upptäcktes i samband med skötselplanarbete i naturvårdsområdet, men det har senare framkommit, att den redan tidigare varit känd av torpets hyresgäster, familjen Rasmusson.

Det finns kanske anledning att förmoda, att grönvita nattviolen i våra trakter ofta är att betrakta som en slätterängsart (ytterligare ett exemplar av arten upptäcktes i naturvårdsområdet, på en äng ca 5 km NV om Kloten) och som sådan således beroende av hävd, för sin fortsatta existens. Gunvor Rasmusson meddelar, att den i Södra Bisen minskat i antal under senare år; möjligen är felaktig slättertidpunkt och den jordpackning, som tunga maskiner åstadkommer, på sikt ett hot mot orkidén i området.

Till sist skall tilläggas, att lokalen närmast skall ses som tomtmark, varför hyresgästen bör kontaktas av envar som ämnar besöka platsen.

TOMMY LENNARTSSON, NORBERG